

UN CIRSIUM NOUVEAU POUR LA FLORE DU MAROC
ET POUR LA SCIENCE.

Par J. ARÈNES.

Cirsium (Subgen. **Lamyra** (Cass.) Ry) **pseudo-hispanicum** J. Ar.
spec. nov.

Planta ± 5 dm. alta, caule ascendenti, basi lignoso, obscure anguloso, vix striato, albo-tomentoso, superne breviter ramoso. Folia haud decurrentia, usque 15 cm. longa, coriacea, supra glabra, subtus dense albo-tomentosa, lanceolato-pinnatifida, lobis lateralibus brevibus simplicibus vel lobulatis, lobulis divaricatis, nervis lateralibus in spinam simplicem vel bifidam fulvam longam vulnerantem productis, lobo terminali ± 5 cm. longo anguste triangulari in spinam luteam debilem longissime attenuato integro. Calathidia pedunculata mediocria, corymbosa; periclinium subglobosum (14-17 mm diam., acumina exclusa), glabrum; bracteae ovato-lanceolatae, intimae acutae erectae, aliae acumine usque 15 mm longo anguste triangulari in spinam luteam brevem vulnerantem longe attenuato-terminatae, acumina media patula, externa patula vel reflexa. Corolla tubo 3 mm longo, fauce 5,5 mm longa, lobis 5-6 mm longis. Achenia linearia, e basi ad apicem vix dilatata, 3,5-4,5 mm longa, paulum compressa, hinc brunnea et costulis 3 luteis obtusis ornata, illinc lutea et tenuiter granosa; pappus albus, setis paulum inaequalibus (11-13 mm longis). — *Typus* in Herb. Mus. Paris, S. Jovet-Ast, P. Jovet et Ch. Sauvage 13543.

Maroc. — Rif (SW) : massif calcaire central, vallon de Tasmout, dans la sapinière; leg. M^{me} S. Jovet-Ast P. Jovet et Ch. Sauvage, 8 juin 1955, sub n^o 13543 (Mission bot. de l'Inst. scient. chérifien dans le Rif central et occidental).

Par sa morphologie foliaire et les caractères de son inflorescence et de son péricline, cette plante diffère du *Cirsium Casabonae* (L.) DC¹. L'espèce la plus voisine est le *Cirsium hispanicum* (DC.) d'Espagne; elle en a le port, l'inflorescence et les caractères généraux du péricline, mais, sont profondément différents, la morphologie foliaire, la taille des calathides et les caractères des akènes. C'est indubitablement une excellente espèce qui se rattache au sous-genre *Lamyra* (Cass.) Ry,² par la présence, à la base de ses anthères, de longs caudicules filiformes et fimbriés.

1. Les noms successifs de cette espèce sont : 1753, *Carduus Casabonae* L.; 1778, *C. polyacanthos* Lmk; 1794, *Cirsium trispinosum* Moench; 1805, *C. Casabonae* DC.; 1822, *Lamyra triacantha* Cass.; 1837, *Chamaepeuce Casabonae* DC. Elle doit donc bien s'appeler *Cirsium Casabonae* (L.) DC.

2. *Lamyra* Cass. 1822 et 1825; *Ptilostemon* Cass. 1825; *Chamaepeuce* DC. 1837.